Blatt

Behandlungsjournal Milchproduktion

TVD-Stempel oder Label-Vignette (freiwillig)

Dieses Behandlungsjournal kann für alle Tierarten verwendet werden. Für jede Tierart ist ein separates Journal zu führen. Es wird empfohlen, je Einzeltier ein separates Journal zu führen. Gemäss Tierarzneimittelverordnung (TAMV) sind im Behandlungsjournal alle Einsätze von Tierarzneimitteln einzutragen. Das Dokument ist während 3 Jahren aufzubewahren.

Jahr	TVD-Nr. / Betriebs-Nr.	Name und Adresse des Betriebes	Tierart
	.		

Behandlungsdatum		Tier-Nr. / Tiername Wurf-Nr. / Bucht-Nr.	Behandlungsgrund Krankheit	Tierarzneimittel		Kritisches Antibiotikum[1]				Absetzfrist in Tagen			Freigabedatum			Herkunft des Arzneimittels
Erstes	Letztes			Handelsname	Dosis	Nein	Ja	Indikation[2]	Datum letztes Antibiogramm[3]	Milch	Fleisch	Organe	Milch	Fleisch	Organe	
9.11.	10.11.	Kroni 5773.4	Akute Mastitis vl	Cobactan LC	75 mg		x	x	9.11.2018	5	4	4	16.11.	15.11.	15.11.	Dr. B. Meier

[1] Eine Liste von Präparaten, welche kritische antimikrobielle Wirkstoffe enthalten, enthält das Tierarzneimittelkompendium.
[2] Das eingesetzte kritische Antibiotikum ist indiziert. Die Behandlung orientiert sich an den Empfehlungen gemäss Therapieleitfaden für Tierärztinnen und Tierärzte (inkl. vorgängige Behandlung mit anderen geeigneten Therapiemethoden).
[3] Beim Einsatz von kritischen Antibiotika muss nachgewiesen werden, dass die Resistenzlage im Bestand bekannt ist (Vorliegen eines aktuellen Antibiogramms, welches innerhalb der letzten 12 Monate erstellt wurde).

© AGRIDEA, 2018

Behandlungsjournal Milchproduktion *(Fortsetzung)*

Behandlungs-datum		Tier-Nr. / Tiername Wurf-Nr. / Bucht-Nr.	Behandlungsgrund Krankheit	Tierarzneimittel		Kritisches Antibiotikum[1]				Absetzfrist in Tagen			Freigabedatum			Herkunft des Arzneimittels
Erstes	Letztes			Handelsname	Dosis	Nein	Ja	Indika-tion[2]	Datum letztes Antibiogramm[3]	Milch	Fleisch	Organe	Milch	Fleisch	Organe	

[1] Eine Liste von Präparaten, welche kritische antimikrobielle Wirkstoffe enthalten, enthält das Tierarzneimittelkompendium.
[2] Das eingesetzte kritische Antibiotikum ist indiziert. Die Behandlung orientiert sich an den Empfehlungen gemäss Therapieleitfaden für Tierärztinnen und Tierärzte (inkl. vorgängige Behandlung mit anderen geeigneten Therapiemethoden).
[3] Beim Einsatz von kritischen Antibiotika muss nachgewiesen werden, dass die Resistenzlage im Bestand bekannt ist (Vorliegen eines aktuellen Antibiogramms, welches innerhalb der letzten 12 Monate erstellt wurde).

© AGRIDEA, 2018