

Mise à l'étable des veaux


	Conditions favorables	Conditions insuffisantes	Conditions défavorables
Provenance des veaux	Un petit nombre d'exploitations connues	Différentes exploitations mais toutes de la région	Différentes exploitations de différentes régions
Préparation des veaux	Abreuvement optimal de colostrum, élevage intensif et vaccination, fer et sélénium	Préparation insuffisante	Pas de préparation et abreuvement de lait insuffisant
Poids des veaux	75 à 85 kg, max. 40 jours	Majorité des veaux > 75 kg (max. 50 jours)	Lot très hétérogène ou présence de veaux très maigres < 65 kg
Transport	Trajet direct < 30 min, pas de regroupement	Trajet direct > 30 min mais ne dépassant pas 6 h	Trajet avec chargement de veaux ou déchargement sur un lieu de rassemblement
Mise à l'étable	Tout dedans / tout dehors, arrivée de tous les veaux le même jour	Tout dedans / tout dehors, arrivée des veaux sur plusieurs jours	Arrivée des veaux en continu
Santé	Yeux clairs, oreilles dressées, pas d'écoulements au niveau du nez ou de diarrhées	Quelques veaux présentent des symptômes légers de maladies	Présence de veaux malades et apathiques dans le groupe
Quarantaine	Les veaux présentant des signes de maladies sont immédiatement isolés et traités individuellement	Les veaux malades sont immédiatement traités individuellement	Pas de mesures spécifiques
Pelage	Brillant, pas de zones sans poils ou de démangeaisons	Certains veaux se grattent, traitement contre les parasites	Poils hirsutes, poux ou dardres
Prophylaxie lors de l'entrée à l'étable	Préparation de vitamines et minéraux, vaccination si pas encore réalisée, déparasitage si nécessaire	Prophylaxie insuffisante	Pas de prophylaxie
Aide à l'abreuvement des veaux	Prise en charge optimale des veaux pour l'abreuvement en eau et en lait	Aide insuffisante	Pas d'aide et pas d'eau à disposition
Manipulation des veaux à leur arrivée	Déchargement dans le calme et avec ménagement		Déchargement brusque et dans la précipitation

Poids des veaux



Veau en bonne santé, bien développé pour son âge, regard clair, pelage brillant. © M. Keller

Santé



Veau en bonne santé : oreilles dressées, regard clair, pas d'écoulement nasal. © M. Keller

Pelage



Veau avec des poux (en haut); veau avec un pelage hirsute et terne (en bas). © C. Bähler

Manipulation des veaux à leur arrivée



Déchargement en douceur. © C. Bähler

Etable des veaux

	Conditions favorables	Conditions insuffisantes	Conditions défavorables
Taille des groupes	Petits groupes jusqu'à 10 animaux	Groupes jusqu'à 40 animaux	Groupes avec plus de 40 animaux
Biosécurité	Pas de possibilités de contact entre les groupes	Boxes séparés dans la même étable	Possibilités de contacts entre les groupes
Surface disponible par veau	Au moins 3 m ² par veau	Au moins 2.5 m ² par veau	Densité d'animaux trop élevée
Qualité de l'air au niveau du museau des veaux	Toujours frais, renouvelé, pas d'odeur d'ammoniac	Air qui ne se renouvelle pas toujours, selon les conditions météo	Ne se renouvelle pas, odeur d'ammoniac
Courant d'air	Climat d'étable agréable, pas de courants d'air, les brins de paille ne bougent pas	Selon les conditions météo et les endroits de l'étable, courants d'air et impossibilité pour tous les veaux de se mettre à l'abri	Courants d'air et pas de possibilité de se mettre à l'abri
Litière	Litière en quantité suffisante > 30 cm, propre, bien répartie et si possible sans poussière	Litière propre mais quantité insuffisante, logettes non paillées	Litière sale et humide
Abreuvoirs	Abreuvoirs avec une surface d'eau ouverte et propre	Abreuvoirs à soupape propres et faciles d'accès	Moins d'un abreuvoir pour 40 animaux, abreuvoir sale (ou ne fonctionnant pas)
Automates à lait	Bien entretenus, bonne hygiène des tétines, hauteur adaptée	Certains points ne sont pas optimaux	Pas entretenus, tétines sales, litière humide en dessous
Etable	Bien isolée, température pas trop élevée	Pas isolée	Pas isolée et périodiquement chauffée par les rayons du soleil
Manipulation des veaux	Prévention du stress primordiale, manipulation des veaux respectueuse et avec ménagement	Prévention du stress plus ou moins importante, manipulation des veaux plutôt brusque	Manipulation des veaux brusque et dans la précipitation, bruits imprévisibles

Taille des groupes et surface disponible par veau



Densité d'animaux adaptée ; place suffisante par veau malgré une taille de groupe pas optimale. © L. Moser



Densité d'animaux trop élevée et taille du groupe trop importante. © L. Moser

Litière




Litière en quantité suffisante, bien répartie et propre. © C. Bähler



Litière sale et humide. © C. Bähler

Abreuvoirs



Abreuvoir avec une surface d'eau ouverte et propre. © M. Klöppel



Abreuvoir à soupape propre (pas optimal). © C. Bähler

Automates à lait



Automate à lait propre. © C. Bähler